Table S2. Hazard ratios for incident functional disability according to peg-moving task and covariates across models

	Model 1		Model 2	
	HR (95% CI)	**p-value**	**HR (95% CI)**	**p-value**
Peg-moving task (s)				
Tertile 1 (≤34.49)	1.00		1.00	
Tertile 2 (34.50–38.78)	1.16 (0.77–1.74)	0.490	1.13 (0.74–1.71)	0.568
Tertile 3 (≥38.79)	2.26 (1.54–3.33)	<0.001	1.92 (1.29–2.87)	0.001
Age (y)	1.14 (1.11–1.18)	<0.001	1.13 (1.10–1.17)	<0.001
Sex				
Female	1.00		1.00	
Male	1.06 (0.83–1.36)	0.625	1.11 (0.85–1.44)	0.444
Education level				
Compulsory	-		1.00	
High school	-		0.79 (0.59–1.06)	0.111
College/junior college	-		0.84 (0.59–1.21)	0.353
No answer	-		1.95 (0.60–6.34)	0.269
Body mass index (kg/m²)				
Underweight, <18.5	-		1.23 (0.76–1.98)	0.405
Normal weight, 18.5–24.9	-		1.00	
Overweight, 25.0–29.9	-		1.18 (0.86–1.61)	0.306
Obesity, ≥30.0	-		2.38 (1.20–4.72)	0.013
Clinical histories (reference: none)				
Stroke	-		1.22 (0.69–2.13)	0.494
Heart disease	-		1.25 (0.88–1.78)	0.206
Hypertension	-		1.03 (0.79–1.35)	0.811
Hyperlipidemia	-		0.63 (0.42–0.94)	0.024
Diabetes	-		1.19 (0.83–1.72)	0.352
PASE (points)	-		0.995 (0.990–0.998)	<0.001

All models were adjusted for baseline year.

PASE, Physical Activity Scale for the Elderly; HR, hazard ratio; CI, confidence interval.