Table S3. Hazard ratios for incident functional disability according to circle-drawing task and covariates across models

	Model 1		Model 2	
	HR (95% CI)	**p-value**	**HR (95% CI)**	**p-value**
Circle-drawing task (points)				
Tertile 1 (≥27)	1.00		1.00	
Tertile 2 (21–26)	1.08 (0.73–1.59)	0.698	1.06 (0.71–1.58)	0.791
Tertile 3 (≤20)	1.84 (1.30–2.59)	0.001	1.66 (1.15–2.41)	0.007
Age (y)	1.15 (1.12–1.18)	<0.001	1.14 (1.11–1.17)	<0.001
Sex				
Female	1.00		1.00	
Male	1.09 (0.85–1.40)	0.478	1.12 (0.86–1.46)	0.400
Education level				
Compulsory	-		1.00	
High school	-		0.85 (0.63–1.15)	0.287
College/junior college	-		1.02 (0.70–1.49)	0.931
No answer	-		2.01 (0.63–6.39)	0.236
Body mass index (kg/m²)				
Underweight, <18.5	-		1.30 (0.82–2.05)	0.261
Normal weight, 18.5–24.9	-		1.00	
Overweight, 25.0–29.9	-		1.22 (0.89–1.68)	0.221
Obesity, ≥30.0	-		2.48 (1.23–4.97)	0.011
Clinical histories (reference: none)				
Stroke	-		1.26 (0.70–2.25)	0.437
Heart disease	-		1.26 (0.88–1.81)	0.199
Hypertension	-		1.04 (0.80–1.36)	0.781
Hyperlipidemia	-		0.61 (0.41–0.91)	0.016
Diabetes	-		1.25 (0.86–1.81)	0.244
PASE (points)	-		0.990 (0.990–0.997)	<0.001

All models were adjusted for baseline year.

PASE, Physical Activity Scale for the Elderly; HR, hazard ratio; CI, confidence interval.